



**EXAMEN**  
**XX CONGRESO PERUANO Y XL CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTERNA**  
**25 AL 28 DE OCTUBRE 2018**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

- 1.- La mortalidad por Neumonía Intrahospitalaria se incrementa por:
  - a. Terapia antibiótica inapropiada
  - b. Tiempo hospitalario reducido
  - c. Monoterapia
  - d. Riesgo para Asma Bronquial
  - e. Todas
  
2. La Neumonía asociada al Ventilador :
  - a. Requiere diagnóstico sólo clínico
  - b. Es de buen pronóstico
  - c. Es ideal obtener muestras distales directas cuantitativas
  - d. Basta con cultivos cualitativos para su diagnóstico
  - e. Ninguna
  
- 3.-Marque el enunciado falso
  - a.- El perímetro de cintura tiene mejor correlación con alteraciones metabólicas al compararlo con IMC.
  - b.-Perímetro de cintura se considera incrementado en hombres mayor a 90 y mujeres mayor a 80 según IDF y mayor a 94 en varones y 90 en mujeres según estudio GLESMO (Venezuela El Salvador Paraguay Mexico Colombia)
  - c.-Adiponectina es aterogénica, y la insulina no estimula su producción.
  - d.-La función del retículo endotelial y la mitocondria se altera en enfermedad crónica no transmisible.
  
- 4.-Marque el enunciado Falso
  - a.-Dieta hipergrasa es capaz de alterar la microbiota intestinal y alterar la permeabilidad de la mucosa intestinal.
  - b.-Activación de los TLR (TollLike Receptor) juegan un papel importante en la metainflamación.
  - c.-Los prebióticos incrementan los ácidos grasos de cadena corta, aumentan las hormonas anorexígenas( PYY) e incretinas.
  - d.-La adiponectina disminuye oxidación de a. grasos y aumenta moléculas de adhesión.
  
- 5.-La profilaxis farmacológica de úlceras gastrointestinales por estrés en pacientes hospitalizados está indicada en:
  - a.- Todos los pacientes hospitalizados
  - b.- Pacientes hospitalizados por cualquier causa pero que reciben AINES
  - c.- Solo los pacientes que tienen factores de riesgo
  - d.-Sólo los pacientes que van a estar en reposo gástrico.
  
- 6.- Son posibles complicaciones del uso de inhibidores de bomba de protones como profilaxis de úlceras gastrointestinales por estrés, excepto:
  - a.- Reacción adversa medicamentosa
  - b.- Neumonía
  - c.- Diarrea por *C difficile*
  - d.- Hemorragia digestiva alta
  
- 7.- Producen Hipokalemia, excepto
  - a.- Nebulización con Beta 2 adrenérgicos
  - b.- Uso de amoxicilina EV
  - c.- Utilización de Insulina en Infusión continua.
  - d.- Alcalosis metabólica
  - e.- Tratamiento con Vitamina B12 de uso Intramuscular

8.- En hiponatremia severa, definida como un Sodio sérico menor de 120 mEq/L. Marque la opción correcta:

- a.- Hay que reponer el Sodio sérico hasta llegar a 125mEq/L
- b.- Como tratamiento, hay que administrar Insulina EV.
- c.- Es provocado por acidosis metabólica
- d.- Es provocado por la administración de Amoxicilina Endovenosa.
- e.- Es frecuente esta presentación, cuando se usa los beta adrenérgicos inhalatorios.

9.- La mayoría de revisiones sistemáticas y de metaanálisis sobre el efecto del cannabis y cannabinoides en el dolor crónico no-cáncer concluyen que:

- a.- Los resultados son controversiales.
- b.- los meta-análisis incluyen ensayos clínicos sesgados.
- c.- La mayoría de ensayos clínicos los han hecho con tetrahidrocanabinol (THC).
- d.- Son eficaces.
- e.- No son eficaces.

10.- Sobre la evaluación de la composición química de los productos de Aceite de Canabidiol comercializados en Europa se puede decir que en su etiquetado señalan:

- a.- 18% tienen la composición exacta
- b.- 10% tienen una concentración por debajo de lo señalado.
- c.-12% tienen una concentración por encima de lo señalado
- d.- La mayoría del aceite de canabidiol tiene también el compuesto THC
- e.-Todas son verdaderas.

11.- La prevalencia de 7% de diabetes mellitus del estudio nacional PERUDIAB, permite afirmar que en mayores de 25 años , existe en el Perú alrededor de:

- a.-2 millones de personas con diabetes
- b.-1/2 millon de personas con diabetes
- c.- 1 millón de personas con diabetes
- d.- No permite hacer aproximación

12.- México es el país que en la región tiene la más alta prevalencia de diabetes; si tomamos en cuenta su incidencia (No de personas /año/1,000), cual es la afirmación correcta:

- a.- Es más alta que Perú
- b.- Es más baja que Perú
- c.- Es similar que la del Perú
- d.- Depende de la estacionalidad

13.- Los anticoagulantes de acción directa están aprobados para uso clínico en:

- a.- Tromboembolia Pulmonar
- b.- Prevención del ACV en Fibrilación auricular no valvular

c.- Prevención de Cardioembolismo en prótesis cardiaca mecánica

- d.- Solo a) y b)
- e.- Solo e) y c)

14.- En pacientes mayores de 85 años, con fibrilación auricular se indica Wuarfarina en:

- a.- Paciente con alto riesgo de caídas
- b.- Paciente con riesgo de sangrado
- c.- Paciente que usa aspirina por enfermedad coronaria
- d.- Todos
- e.- Ninguno

15.- Respecto al tratamiento del Cáncer en el adulto mayor frágil marque lo verdadero:

- a.- El tratamiento debe ser igual que un paciente joven con una intención curativa
- b.- La elección del tratamiento debe estar bien equilibrada entre la efectividad, tolerabilidad y calidad de vida.
- c.- El objetivo del tratamiento debe ser mantener la calidad de vida independiente de su eficacia
- d.- No debe recibir ningún tratamiento
- e.- Todas son verdaderas.

16.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos tiene una mayor sensibilidad para identificar al adulto mayor que requiere una valoración geriátrica integral?:

- a.- Fried
- b.- VES 13
- c.-G8 (Geriátrico 8)
- d.- Barber
- e.- Índice fragilidad de Gromingen

17.- La vacuna contra influenza está indicada en

- a.-Todos los adultos
- b.- Solo adultos mayores de 65 años
- c.- Solo adultos menores de 65 años
- d.- Solo adultos con enfermedades crónicas

18.-Las vacunas contra neumococo (PCV13 Y PPSV23) están indicadas en:

- a.- Solo adultos mayores de 65 años
- b.- Solo adultos menores de 65 años
- c.- En adultos con algunas enfermedades crónicas menores de 65 años y todos los adultos mayores de 65 años
- d.- Solo en adultos con enfermedades crónicas menores de 65 años.

19.-Qué virus induce un linfoma con la triada Linfocitosis, lesiones cutáneas e hipercalcemia?

- a.- EBV
- b.- HTLV-1
- c.- Helicobacter P.
- d.-Borrellia B.
- e.- Campilovbacter J

20.- Frecuencia de Linfomas de Hodking que se curan:

- a.- 10%
- b.- 30%
- c.- 50%
- d.- 100%
- e.- . 80%

