

CASO CLÍNICO No. 5

CLÍNICA DELGADO

Paciente mujer de 66 años con lumbalgia y debilidad en miembros inferiores

Paciente mujer de 66 años con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con telmisartán 80 mg diaria, hidroclorotiazida 12.5 mg diaria, bisoprolol 5 mg diaria. Además, diagnóstico de resistencia a la insulina + obesidad en tratamiento con metformina 750 mg 2 veces al día, glaucoma en tratamiento con timolol 0.5 mg 2 gotas 2 veces al día. Paciente portadora de marcapaso recambio en octubre 2022, además con diagnóstico de lumbociatalgia + radiculopatía L5-S1 severa) recibe tratamiento con terapia física. Esteatosis hepática severa: Fibroscan enero 2023

Acude con un tiempo de enfermedad de 2 meses donde refiere dolor lumbar asociado a debilidad en miembros inferiores que le dificulta la deambulación, además refiere adormecimiento en miembros inferiores. 2 semanas antes del ingreso presenta dolor lumbar en aumento, debilidad progresiva en miembros inferiores asociado a edemas en ambas extremidades, además indica que presenta dificultad para la incorporación como levantarse de la cama en sedestación, subir escaleras y deambulación, 1 semana antes del ingreso paciente refiere persistencia de dolor lumbar y edemas, indica que se agrega mialgias a predominio de miembros inferiores. 2 días antes del ingreso paciente presenta persistencia de síntomas, se agrega debilidad en miembros superiores e hiporexia, epigastralgia y astenia por lo que acude a clínica.